PULMEX

PULMEX®

(NOVARTIS CONSUMER HEALTH)

VI D 3

Dénomination:
PULMEX® pommade
PULMEX® Baby pommade (sans camphre ajouté)

Titulaire d'enregistrement:
Novartis Consumer Health s.a., Medialaan 30/5, 1800 Vilvoorde.

Fabricant:
Novartis Consumer Health s.a., CH - 1260 Nyon/Vaud.

Composition:
Pulmex pommade
Benzylis benzoas * 53,4 mg — Benzylis cinnamas * 6 mg — Vanillinum * 0,6 mg — Camphor. 125 mg — Rosmarini aetherol. 50 mg — Eucalypti aetherol. 50 mg — Polysorbatum — Carbomer. — Natr. hydroxyd. — Aqua purificata q.s. ad 1 g.
Pulmex Baby
Benzylis benzoas * 53,4 mg — Benzylis cinnamas * 6 mg — Vanillinum * 0,6 mg — Rosmarini aetherol. 50 mg — Eucalypti aetherol. 50 mg — Polysorbatum — Carbomer. — Natr. hydroxyd. — Aqua purificata q.s. ad 1 g.
*: Bals. peruvian. sine resina.

Formes pharmaceutiques, voie d'administration et conditionnements:
Pulmex pommade: tube de 40 g, usage externe.
Pulmex Baby: tube de 20 g, usage externe.

Propriétés pharmacologiques:

Pulmex exerce une action décongestionnante et expectorante: il faciliterait ainsi la respiration dans les affections des voies respiratoires. La pommade soulage par sa résorption cutanée locale et elle n'irrite pas la peau. Elle ne laisse pas de dépôts gras et ne tache pas de linge.

Indications:

La pommade est proposée comme traitement d'appoint des symptômes associés aux pathologies des voies respiratoires supérieures, après que toute pathologie sévère ait été écartée.

Posologie et mode d'emploi:

Appliquer matin et soir la pommade sur la partie supérieure de la poitrine et du dos, le long de la ligne médiane, et frictionner légèrement jusqu'à pénétration complète. Recouvrir ensuite d'une flanelle propre. Ne pas appliquer sur le visage, près des yeux ou de la bouche.
Pulmex pommade.
Adultes: appliquer une quantité de pommade de la taille de 3 - 4 "noisettes". Enfants de plus de 7 ans: 2 "noisettes". Enfants de 3 à 7 ans: 1 "noisette".
Pulmex Baby.
Enfants de 6 mois à 3 ans: 1 "noisette" de pommade. Dose maximale: ne pas dépasser 4 applications de pommade par jour.

Contre-indications:

L'usage de Pulmex pommade est contre-indiqué chez les enfants de moins de 3 ans. Chez ceux-ci, la pommade Pulmex Baby peut être appliquée; toutefois, ne pas utiliser Pulmex Baby chez les enfants de moins de 6 mois. Ne pas employer en cas d'hypersensibilité à un des constituants du produit. Ne pas utiliser en cas d'antécédents de convulsions. Ne pas appliquer sur des lésions cutanées (plaies, blessures, érythème, eczéma, etc., ...).

Effets indésirables:

L'évaporation de Pulmex peut provoquer une irritation des yeux avec larmoiements. Le baume du Pérou peut, dans certains cas, provoquer une sensibilisation avec dermatite de contact. En cas d'exposition des yeux ou des muqueuses, laver avec de l'eau fraîche.

Précautions particulières:

Ne pas utiliser Pulmex pommade chez les enfants de moins de 3 ans. Chez ceux-ci, la pommade Pulmex Baby peut être appliquée; toutefois, ne pas employer Pulmex Baby chez les enfants de moins de 6 mois. Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants. Comme il ne s'agit que d'un traitement symptomatique, en aucun cas il ne pourra empêcher ou retarder un traitement étiologique éventuel si la symptomatologie persiste ou s'aggrave après 7 jours de traitement.

Grossesse et lactation:
Le camphre passe la barrière placentaire. En raison de l'absence d'études de reproduction chez l'animal ou de données sur la grossesse, ne pas utiliser Pulmex pendant toute la grossesse. On ne dispose pas d'information concernant le passage des constituants des produits dans le lait maternel. Il est donc recommandé de ne pas employer Pulmex pendant l'allaitement.

Interactions:
L'expérimentation animale chez le rat a montré que l'eucalyptol (1,8-cinéol) provoquait une induction microsomiale des enzymes hépatiques lors de l'administration sous-cutanée ou en aérosol. Aucun cas d'interaction n'a été signalé jusqu'à présent.

Surdosage:
Les quantitiés de camphre contenues dans Pulmex pommade: de 5,2 à 5,3 g/tube; Pulmex Baby: de 90 à 140 mg/tube. Le camphre pur, à doses toxiques, peut agir directement sur les centres médullaires et sur certains centres cervicaux. Des cas de surdosage avec le camphre ont été rapportés, particulièrement chez les enfants, après ingestion, application cutanée ou nasale. *Les symptômes de surdosage avec du camphre ou de l'eucalyptol sont:* nausées, vomissements, coliques, maux de tête, vertiges, sensation de chaleur, difficultés respiratoires, délirium, convulsions, dépression du système nerveux central et coma. Des doses comprises entres 10 et 20 g de camphre sont dangereuses pour l'adulte. *Les mesures habituelles d'assistance:* charbon activé, laxatifs salins et lavage gastrique en cas d'ingestion, doivent être entreprises. Les convulsions seront traitées par injection lente de benzodiazépines ou de barbituriques à courte durée d'action. En cas d'intoxication grave, une hospitalisation est nécessaire pour observation et/ou traitement.

Conservation:
A température ambiante.
Les préparations Pulmex ont une durée de validité limitée. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage extérieur après les lettres EXP suivies de 6 chiffres: les 2 premiers indiquent le mois (1er jour) et les 4 derniers l'année.

Délivrance:
Libre.

Date de la dernière mise à jour de la notice:
28.10.2002.

Nom	Forme	CNK	Prix	Rb	Type
PULMEX	40G POMM .	0856-104	€ 5.26	D	Original
PULMEX BABY	20G POMM .	0128-066	€ 3.83	D	Original